

貯法：室温保存
有効期間：5年

日本標準商品分類番号

875200

漢方製剤

承認番号 16200AMY00396000

販売開始 1988年10月

TY-054

〔東洋〕^{しくんしとう}四君子湯エキス細粒

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	〔東洋〕四君子湯エキス細粒
有効成分	本剤1日量（6.0g）中、下記の混合生薬より抽出した四君子湯の水製エキス3.3gを含有する。 日局ニンジン・・・4.0g 日局カンゾウ・・・1.5g 日局ビャクジュツ・4.0g 生ショウキョウ・・・1.5g 日局ブクリョウ・・・4.0g 日局タイソウ・・・1.5g
添加剤	トウモロコシデンプン（賦形剤）

3.2 製剤の性状

剤形	細粒剤
色調	褐色
識別コード	TY-054
におい	特異な臭い
味	やや甘く、後にやや辛い

4. 効能又は効果

やせて顔色が悪くて、食欲がなく、つかれやすいものの次の諸症：胃腸虚弱、慢性胃炎、胃のもたれ。

6. 用法及び用量

通常1日3回 1回2.0g（1包）を空腹時経口投与
年令症状により適宜増減する。

8. 重要な基本的注意

- 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- 本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や血圧値等に十分留意すること。〔10.2、11.1.1、11.1.2参照〕
- 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。

10. 相互作用

10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カンゾウ含有製剤 芍薬甘草湯 補中益気湯 抑肝散 等 グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤 グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-システイン グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等 〔8.2、11.1.1、11.1.2参照〕	偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。	グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 偽アルドステロン症（頻度不明）

低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察（血清カリウム値の測定等）を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。〔8.2、10.2参照〕

11.1.2 ミオパチー（頻度不明）

低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。〔8.2、10.2参照〕

11.2 その他の副作用

頻度不明	
過敏症	発疹、蕁麻疹等

20. 取扱い上の注意

- 本剤の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。
- 本剤は生薬を原料としているので、色調、味、においが異なることがある。

22. 包装

- 500g〔ボトル〕
- 2.0g×252包〔分包〕

24. 文献請求先及び問い合わせ先

株式会社東洋薬行
〒113-0033 東京都文京区本郷6-19-7
TEL 03-3813-2263
FAX 03-3813-0202

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元
株式会社東洋薬行
東京都文京区本郷6-19-7