

【禁忌】 次の患者には投与しないこと
本剤に対し過敏症の既往歴のある患者

【使用上の注意】

副作用

過敏症（頻度不明）：発疹等の過敏症状があらわれた場合には投与を中止すること。

【薬効薬理】

デンプン消化作用： α 、 β -アミラーゼを含み、デンプンを麦芽糖、低級デキストリンにまで消化する。至適pHは4.5～5.5で、強酸性又は強アルカリ性により失活する。

【取扱い上の注意】

吸湿しやすいので、使用後は保存方法に注意すること。

消化酵素剤

日本薬局方 ジアスターゼ

ジアスターゼ「ヤマゼン」M

Diastase "Yamazen" M



製造販売元



山善製薬株式会社

大阪府中央区道修町2丁目2番4号

2008年 5月改訂

日本標準商品分類番号872331

貯法等 保存条件：30℃以下で保存

承認番号16000AMZ06484000

容 器：気密容器

(薬価基準収載)

使用期限：3年

販売開始 1985年12月

再評価結果 1983年4月

【組成・性状】

本品は主として麦芽から製したもので、でんぷん消化力がある酵素剤であり、定量するとき、1g当たり440でんぷん糖化力単位以上を含む。

本品は淡黄色～淡褐色の粉末である。

本品は吸湿性である。

【効能・効果】

主として炭水化物の消化異常症状の改善。

【用法・用量】

ジアスターゼとして、通常成人1回0.3～0.5gを1日3回食後に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。



外装フィルム：PVC
容器本体は「缶（鉄）」です。

GS1-RSS