

2023年8月改訂（第1版）

鎮痛・鎮痒・消炎剤

貯法：室温保存

カンフル精

Camphor Spirit

有効期間：3年

日本標準商品分類番号	
872645	
承認番号	14600AMZ02359
販売開始	1982年2月

3. 組成・性状

3.1 組成

有効成分	100mL 中 日本薬局方 dl-カンフル 10g
添加剤	エタノール

3.2 製剤の性状

性状	無色澄明の液でカンフルの香気を有する。
----	---------------------

4. 効能又は効果

下記疾患における局所刺激、血行の改善、消炎、鎮痛、鎮痒
筋肉痛、挫傷、打撲、捻挫、凍傷（第1度）、凍瘡、皮膚そう痒症

6. 用法及び用量

通常、患部に適量を塗布あるいは塗擦する。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	発赤、発疹等の過敏症状

14. 適用上の注意

14.1 薬剤使用時の注意

- 14.1.1 水疱性タイプの症状には有害であるため、湿潤面への使用は避けること。
- 14.1.2 眼又は眼の周囲には使用しないこと。
- 14.1.3 引火性があり、爆発の危険性もあるため、火気には十分注意すること。[20. 参照]

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

揮発性のため、皮膚内への浸透性が強く、血管を拡張し発赤を与え、神経反射を呼んで鎮痛、鎮痒作用を示す¹⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：dl-カンフル（dl-Camphor）

化学名：(1RS,4RS)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one

分子式：C₁₀H₁₆O

分子量：152.23

性状：無色又は白色半透明の結晶、結晶性の粉末又は塊で、特異な芳香がある。

エタノール（95）、ジエチルエーテル又は二硫化炭素に溶けやすく、水に溶けにくい。室温で徐々に揮散する。

20. 取扱い上の注意

気密容器に入れ、火気を避けて保存すること。[14.1.3 参照]

22. 包装

500mL（ガラス瓶）

23. 主要文献

1) 日本薬局方 医薬品情報 1996

24. 文献請求先及び問い合わせ先

山善製薬株式会社 学術室

〒541-0045 大阪市中央区道修町2丁目2番4号

TEL 06-6231-1821 FAX 06-6231-1824

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

山善製薬株式会社

大阪市中央区道修町2丁目2番4号