

承認番号	16100AMZ01286
薬価収載	1979年1月
販売開始	1979年1月
再評価結果	1979年2月

収斂・消炎・保護剤

酸化亜鉛「ニッコー」

ZINC OXIDE「NIKKO」

日本薬局方 酸化亜鉛

【禁忌】（次の部位には使用しないこと）

- 重度または広範囲の熱傷
[酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遷延させることがある。]
- 患部が湿潤している場合
[酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遷延させることがある。]

【組成・性状】

1. 組成

本品 1g 中 日局酸化亜鉛 1g 含有。

2. 性状

本品は白色の無晶性の粉末で、におい及び味はない。
本品は水、エタノール(95)、酢酸(100)またはジエチルエーテルにほとんど溶けない。
本品は希塩酸または水酸化ナトリウム試液に溶ける。
本品は空气中で徐々に二酸化炭素を吸収する。

【効能・効果】

軽度の皮膚病変の収れん・消炎・保護・緩和な防腐

【用法・用量】

- 外用散剤（散布剤）として 15～100%
 - 軟膏剤・液剤（懸濁剤・リニメント剤・ローション剤等）として 2～60%
- 上記濃度に調製し、いずれも症状に応じ 1 日 1～数回患部に適用する。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^注	過敏症状
皮膚 ^注	発疹、刺激感等

注) このような症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

2. 適用上の注意

- (1) 誤って吸入しないように注意させること。
- (2) 眼には使用しないこと。