

※※ 2017年10月改訂（第8版）
※ 2016年 5月改訂（第7版）

手指用殺菌消毒薬 ヘキザック[®]スクラブ

【禁忌（次の場合には使用しないこと）】

クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある者

【組成・性状】

1.組成 本剤100mL中、日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液20mL（クロルヘキシジングルコン酸塩として4g）を含有する。添加物として、ラウロマクロゴール、プロビレングリコール、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、モノステアリン酸ポリエチレングリコール、ラウリン酸ジエタノールアミド、エタノール、ラウリルジメチルアミンオキシド液、pH調整剤、赤色102号、香料、その他2成分を含有する。

2.製剤の性状 本剤は、赤色澄明のやや粘性的液で、わずかに芳香がある。
pH:5.7～6.7 比重d₂₀:約1.02

【効能・効果】

医療施設における医師、看護師等の医療従事者の手指消毒

【用法・用量】

1.術前、術後の術者の手指消毒の場合

手指及び前腕部を水でぬらし、本剤約5mLを手掌にとり、1分間洗浄後、流水で洗い流し、更に本剤約5mLで2分間洗浄をくりかえし、同様に洗い流す。

2.以外の医療従事者の手指消毒の場合

手指を水でぬらし、本剤約2.5mLを手掌にとり1分間洗浄後、流水で洗い流す。

【使用上の注意】

1.慎重投与（次の場合には慎重に使用すること）

薬物過敏症体质の者

※※2.重要な基本的注意

ショック、アナフィラキシー等の反応を予測するため、使用に際してはクロルヘキシジン製剤に対する過敏症の既往歴、薬物過敏症の有無について十分な問診を行うこと。

3.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

※※ (1)重大な副作用

ショック(0.1%未満)、アナフィラキシー(頻度不明):ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので観察を十分に行い、血圧低下、荨麻疹、呼吸困難等があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。

(2)その他の副作用

過敏症 発疹等(0.1～5%未満)

症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

4.適用上の注意

(1)投与経路 手指消毒以外の目的には使用しないこと。

(2)使用時 ①本剤の使用中に誤って眼に入らないように注意すること。
眼に入った場合には、直ちによく水洗すること。

※ ②溶液の状態で長時間皮膚と接触させた場合に皮膚化学熱傷を起こしたとの報告があるので、注意すること。

5.その他の注意

クロルヘキシジングルコン酸塩製剤の投与によりショック症状を起こした患者のうち数例について、血清中にクロルヘキシジンに特異的なIgE抗体が検出されたとの報告がある。

【取扱い上の注意】

(1)経口投与しないこと。誤飲した場合には、牛乳、生卵、ゼラチン等を用いて、胃洗浄を行うなど適切な処理を行う。

(2)本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。

(3)本剤の付着した白布を次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系漂白剤で漂白すると、褐色のシミができることがある。漂白には過炭酸ナトリウム等の酸素系漂白剤が適当である。

(4)他の洗浄剤などと混ぜないこと。

【文献請求先】吉田製薬株式会社 学術部
東京都中野区中央5-1-10



キャップ:PP
ボトル:PE

202004

ヘキザック[®]スクラブ

クロルヘキシジン製剤
手指用殺菌消毒薬

500mL

調剤 販売

日本標準商品分類番号
872619

承認番号 21200AMZ00601000

葉価収載 葉価基準対象外

販売開始 2001年 1月

貯法：遮光、室温保存
使用期限：ラベルに記載

（01）04987288155027

製造番号

使用期限

ヨシダ[®]製薬

製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951

H
E
X
i
Z
A
C

S
C
R
U
B