

貯 法：室温保存

使用期限：3年（表示の使用期限を参照すること。）

承認番号	16100AMZ01305
薬価収載	1979年1月
販売開始	1998年4月
再評価結果	1981年8月

去痰剤

セネガシロップ「ニッコー」

SENEGA SYRUP「NIKKO」

日本薬局方 セネガシロップ

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）

ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン塩酸塩を投与中の患者（「1. 相互作用」の項参照）

【組成・性状】

1. 組成

本品100mL中 日局セネガ4gの10vol%エタノール抽出液を含有する。添加物として白糖を含有する。

2. 性状

本品は黄褐色の濃稠な液で、サリチル酸メチル様の特異なおいがあり、味は甘い。

【効能・効果】

下記疾患に伴う喀痰喀出困難

急性気管支炎、感冒・上気道炎

【用法・用量】

セネガシロップとして、通常成人1日10～35mLを3回に分割経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

1. 相互作用

(1) 併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ジスルフィラム （ノックピン） シアナミド （シアナマイド） カルモフル （ミフロール） プロカルバジン 塩酸塩	これらの薬剤とのアルコール反応（顔面潮紅、血圧降下、悪心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下等）を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

(2) 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフェム系抗生物質 セフメノキシム塩酸塩 セフォペラゾンナトリウム セフペラゾンナトリウム セフミノクスナトリウム水和物 セフメタゾールナトリウム ラタモキシセフナトリウム メトロニダゾール	これらの薬剤とのアルコール反応（顔面潮紅、悪心、頻脈、多汗、頭痛等）を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

その他の副作用

大量投与 嘔気、嘔吐、下痢、食欲不振（頻度不明）を起こすことがある。

【取扱い上の注意】

本剤は原料に天然物が含まれておりますので、その産地や採集時期により、製品の色調やにおいが一定しないことがあります。

【包装】

500mL

【製品に関するお問い合わせ先】

日興製薬販売株式会社 製品情報窓口
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町3番地
TEL. 03-3254-1831

発売元

日興製薬販売株式会社

東京都千代田区神田紺屋町32番地

製造販売元

日興製薬株式会社

岐阜県羽島市江吉良町1593