

貯 法：2～8℃保存（凍結不可）

有効期間：3年

アレルギー検査薬

処方箋医薬品^{注)}

診断用スクラッチエキス 食品類(穀類、野菜類、果実類、その他)

販売名	承認番号	販売開始
アレルギースクラッチエキス「トリエ」小麦粉	14000AZZ04644000	1965年10月
アレルギースクラッチエキス「トリエ」米	14000AZZ04645000	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」コンニャク粉	14000AZZ04646000	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」ソバ粉	14000AZZ04647000	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」トウモロコシ	14000AZZ04648000	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」パン	14000AZZ04649000	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」モチ米	14000AZZ04650000	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」エダマメ	14000AZZ04697000	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」キャベツ	14000AZZ04698000	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」ゴマ	14000AZZ04704000	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」シイタケ(乾)	14000AZZ04708000	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」ジャガイモ	14000AZZ04710000	

販売名	承認番号	販売開始
アレルギースクラッチエキス「トリエ」タケノコ	14000AZZ04715000	1965年10月
アレルギースクラッチエキス「トリエ」タマネギ	14000AZZ04716000	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」トマト	14000AZZ04718000	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」ニンジン	14000AZZ04721000	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」ホウレン草	14000AZZ04726000	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」ラッカセイ	14000AZZ04728000	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」アーモンド	14000AZZ04733000	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」リンゴ	14000AZZ04747000	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」イースト(パン種)	14000AZZ04748000	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」ココア	14000AZZ04750000	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」チョコレート	14000AZZ04753000	

注) 注意-医師等の処方箋により使用すること

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	組成	添加剤
アレルギースクラッチエキス「トリエ」小麦粉	本剤は原料を50%グリセリン食塩溶液で抽出して得た特異的アレルギーを含むもので、原料重量に対し、10倍液(1:10)である。	濃グリセリン50%(w/w)塩化ナトリウム5%(w/w)
アレルギースクラッチエキス「トリエ」米		
アレルギースクラッチエキス「トリエ」コンニャク粉		
アレルギースクラッチエキス「トリエ」ソバ粉		
アレルギースクラッチエキス「トリエ」トウモロコシ		
アレルギースクラッチエキス「トリエ」パン		
アレルギースクラッチエキス「トリエ」モチ米		
アレルギースクラッチエキス「トリエ」エダマメ		
アレルギースクラッチエキス「トリエ」キャベツ		
アレルギースクラッチエキス「トリエ」ゴマ		
アレルギースクラッチエキス「トリエ」シイタケ(乾)		
アレルギースクラッチエキス「トリエ」ジャガイモ		
アレルギースクラッチエキス「トリエ」タケノコ		
アレルギースクラッチエキス「トリエ」タマネギ		
アレルギースクラッチエキス「トリエ」トマト		
アレルギースクラッチエキス「トリエ」ニンジン		
アレルギースクラッチエキス「トリエ」ホウレン草		
アレルギースクラッチエキス「トリエ」ラッカセイ		
アレルギースクラッチエキス「トリエ」アーモンド		
アレルギースクラッチエキス「トリエ」リンゴ		

販売名	組成	添加剤
アレルギースクラッチエキス「トリエ」イースト(パン種)	本剤は原料を50%グリセリン食塩溶液で抽出して得た特異的アレルギーを含むもので、原料重量に対し、10倍液(1:10)である。	濃グリセリン50%(w/w)塩化ナトリウム5%(w/w)
アレルギースクラッチエキス「トリエ」ココア		
アレルギースクラッチエキス「トリエ」チョコレート		

3.2 製剤の性状

販売名	性状	pH
アレルギースクラッチエキス「トリエ」小麦粉	無色透明の液	4.0～7.0
アレルギースクラッチエキス「トリエ」米	無色透明の液	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」コンニャク粉	淡褐色～褐色透明の液	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」ソバ粉	淡褐色透明の液	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」トウモロコシ	無色透明の液	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」パン	ほとんど無色透明の液	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」モチ米	無色透明の液	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」エダマメ	淡黄色透明の液	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」キャベツ	淡黄色透明の液	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」ゴマ	わずかに褐色～暗褐色透明の液	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」シイタケ(乾)	淡褐色～褐色透明の液	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」ジャガイモ	褐色透明の液	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」タケノコ	淡黄褐色透明の液	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」タマネギ	淡黄色透明の液	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」トマト	淡黄色透明の液	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」ニンジン	淡黄色透明の液	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」ホウレン草	褐色透明の液	
アレルギースクラッチエキス「トリエ」ラッカセイ	淡黄褐色透明の液	

販売名	性状	pH
アレルギースクラッチエキス「トリイ」アーモンド	淡黄色澄明の液	4.0～7.0
アレルギースクラッチエキス「トリイ」リンゴ	黄色澄明の液	3.0～5.5
アレルギースクラッチエキス「トリイ」イースト（パン種）	淡黄色澄明の液	4.0～7.0
アレルギースクラッチエキス「トリイ」ココア	褐色澄明の液	
アレルギースクラッチエキス「トリイ」チョコレート	淡褐色澄明の液	

4. 効能又は効果

診断

アレルギー性疾患のアレルゲンの確認

6. 用法及び用量

診断

通常乱刺または切皮法により皮膚面に出血しない程度に傷をつけ、本品1滴を滴下し、15～30分後に膨疹径が対照の2倍以上または5mm以上を陽性とする。

7. 用法及び用量に関連する注意

- 7.1 正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト検査前日から抗ヒスタミン薬やメチルエーター遊離抑制薬等の投与を中止すること。
また、皮膚反応テストを実施する約1週間前から投与を中止することが望ましい薬剤があるので注意すること。
- 7.2 反応が陰性を示したときでも、問診等から原因アレルゲンとして特に疑われる場合には、日を改めて再検査することが望ましい。

8. 重要な基本的注意

- 8.1 ショック、アナフィラキシー等の発現を予測するため、十分な問診を行うこと。[11.1.1 参照]
- 8.2 ショック、アナフィラキシー等の発現時に救急処置のとれる準備をしておくこと。[11.1.1 参照]
- 8.3 投与後患者を安静の状態に保たせ、十分な観察を行うこと。[11.1.1 参照]

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 非選択的β遮断薬投与中の患者

検査のために本剤が投与されたときに、本剤による反応（アレルギー反応）が強くなる可能性がある。
また、本剤によるアレルギー反応の処置のためにアドレナリンを投与したとき、アドレナリンの効果が通常の用量では十分発現しないことがある。

9.1.2 三環系抗うつ薬及びモノアミンオキシダーゼ阻害薬(MAOI)投与中の患者

本剤によるアレルギー反応の処置のためにアドレナリンを投与したとき、アドレナリンの効果が増強されることがある。

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、診断上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。但し、妊娠中はヒスタミン遊離が考えられる広範な皮膚反応テストは避けること。ヒスタミンは子宮筋収縮作用を有することが知られている。

9.6 授乳婦

診断上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

9.8 高齢者

検査に際しては注意すること。一般に生理機能が低下している。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 ショック、アナフィラキシー（いずれも頻度不明）

くしゃみ、蕁麻疹、血管浮腫、不快感、口内異常感、喘鳴、耳鳴等の異常があらわれた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。[8.1-8.3 参照]

11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	喘息発作の誘発、眼瞼又は口唇の浮腫、発疹、そう痒等

14. 適用上の注意

14.1 薬剤投与時の注意

別途販売のスクラッチエキス用対照液（アレルギースクラッチエキス対照液「トリイ」）を同時に用いて反応を比較すること。

14.2 薬剤投与後の注意

投与部位のアレルギー症状が数日持続する場合がある。

14.3 診断上の注意

原因アレルゲンの特定に際しては、本剤による検査結果のみではなく、問診や特異的IgE抗体検査の結果等も踏まえて総合的に判定すること。

18. 薬効薬理

18.1 測定法

本剤は投与皮膚局所においてヒスタミン等のケミカルメディエーターを遊離させ、膨疹及び紅斑を惹起させると考えられる。

20. 取扱い上の注意

- 20.1 使用後は汚染を防ぐためスポイトキャップをよく締めること。

22. 包装

1 mL（点滴用スポイト付瓶）

24. 文献請求先及び問い合わせ先

鳥居薬品株式会社 お客様相談室
〒103-8439 東京都中央区日本橋本町3-4-1
TEL 0120-316-834
FAX 03-3231-6890

*25. 保険給付上の注意

〈小麦粉、エダマメ、ジャガイモ、トマト、ニンジンを除く〉
本剤は保険給付の対象とならない（薬価基準からの削除）。

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元



鳥居薬品株式会社

東京都中央区日本橋本町3-4-1