

貯法：室温保存  
有効期間：3年

去痰剤  
日本薬局方

日本標準商品分類番号	
872231	
承認番号	16100AMZ00930
販売開始	1949年1月

## セネガシロップ

セネガシロップ シオエ  
Senega Syrup SIOE

**2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）**  
ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン塩酸塩を投与中の患者 [10.1 参照]

### 3. 組成・性状

#### 3.1 組成

販売名	セネガシロップ シオエ
有効成分	100mL中 セネガ 4g
添加剤	白糖、エタノール、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸イソプロピル

#### 3.2 製剤の性状

販売名	セネガシロップ シオエ
性状	黄褐色の濃稠な液で、サリチル酸メチル様の特異なおいがあり、味は甘い。

### 4. 効能又は効果

下記疾患に伴う喀痰喀出困難  
急性気管支炎、感冒・上気道炎

### 6. 用法及び用量

通常、成人1日10～35mLを3回に分割経口投与する。  
なお、年齢、症状により適宜増減する。

### 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

#### 9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

#### 9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

### 10. 相互作用

#### 10.1 併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ジスルフィラム（ノックピン）、シアナミド（シアナミド）、カルモフル、プロカルバジン塩酸塩 [2.参照]	これらの薬剤とのアルコール反応（顔面潮紅、悪心、頻脈、多汗、頭痛等）を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

#### 10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフェム系抗生剤（セフェム系抗生剤） キシム塩酸塩、セフォペラゾンナトリウム、セフミノクスナトリウム水和物、セフメタゾールナトリウム、ラタモキシセフナトリウム）、メトロニダゾール	これらの薬剤とのアルコール反応（顔面潮紅、悪心、頻脈、多汗、頭痛等）を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

### 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

#### 11.2 その他の副作用

	頻度不明
消化器 <sup>注)</sup>	嘔気、嘔吐、下痢、食欲不振

注) 大量投与によりあらわれることがある。

### 18. 薬効薬理

#### 18.1 作用機序

咽頭などの粘膜刺激により舌咽神経を介して反射的に気道液分泌を増加し、分泌された粘液の排出機能をも亢進し、去痰作用を現すと推定される<sup>1)</sup>。

### 20. 取扱い上の注意

本剤は原料に天然物が含まれているため、その産地や採集時期により、製品の色調やにおいが一定しないことがある。

### 22. 包装

500mL（ガラス瓶）

### 23. 主要文献

1) 第十八改正日本薬局方解説書 廣川書店、2021：D-561・D-562

24. 文献請求先及び問い合わせ先

丸石製薬株式会社 学術情報部

〒538-0042 大阪市鶴見区今津中 2-4-2

TEL.0120-014-561

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

**シオエ製薬株式会社**

兵庫県尼崎市潮江 3 丁目 1 番 11 号

26.2 発売元

**Ⓜ 丸石製薬株式会社**

大阪市鶴見区今津中2-4-2