

外用殺菌消毒剤

薬価基準未収載

消毒用エタノール綿「ヨシダ」4×8

76.9~81.4vol%エタノール含浸綿

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒
手術部位(手術野)の皮膚の消毒
医療機器の消毒

※ **火気厳禁**

日本標準商品分類番号

872615

承認番号 21800AMX10570000

薬価収載 薬価基準未収載

販売開始 2007年9月

4cm×8cm **100包**
(2つ折り)
1枚入

消毒用エタノール綿「ヨシダ」4×8

4cm×8cm(2つ折り) 1枚入 **100包**

貯法：遮光した気密容器に入れ、
火気を避けて保存
使用期限：箱に記載

【禁忌(次の部位には使用しないこと)】
損傷皮膚及び粘膜(損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。)

【組成・性状】

1. 組成

成分・含量	担体	含浸量
本溶液100mL中、 日局エタノール 83mL	医療脱脂綿	医療脱脂綿 22.2g あたり本溶液 100mL

(1包中76.9~81.4vol%エタノール1.44mLを含む)

2. 性状

本品に含浸している液は無色澄明な液で、特異なにおいがある。

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、手術部位(手術野)の皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】

本剤をそのまま消毒部位に塗布する

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本剤が眼に入らないように注意すること。
入った場合には直ちに水でよく洗い流すこと。
- (2) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。(エタノール蒸気に大量又は繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。)

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類・頻度	頻度不明	注
過敏症 ^{注1)}	発疹等	注)このような症状があらわれた場合には
皮膚 ^{注2)}	刺激症状	使用を中止すること。

3. 適用上の注意

- (1) 投与経路：外用にのみ使用すること。
- (2) 使用時
 - 1) 同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
 - 2) 本剤は血清、膿汁等のたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落してから使用すること。

【薬効薬理】

本剤は使用濃度において栄養型細菌(グラム陽性菌、グラム陰性菌)、真菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞及び一部のウイルスに対する効果は期待できない。

【取扱い上の注意】

開封後は速やかに使用すること。

【文献請求先】

吉田製薬株式会社 学術部
〒164-0011 東京都中央区5-1-10
TEL 03-3381-2004



ヨシダ製薬

製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入951