

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）

ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン塩酸塩を投与中の患者（「相互作用」の項参照）

【使用上の注意】

1. 相互作用

(1) 併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン塩酸塩
臨床症状 措置方法	これらの薬剤とのアルコール反応（顔面潮紅、血圧低下、悪心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下等）を起こすおそれがある。
機序・危険因子	本剤はエタノールを含有しているため。

(2) 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフェム系抗生物質（セフメノキシム塩酸塩等）、メトロニダゾール
臨床症状 措置方法	これらの薬剤とのアルコール反応（顔面潮紅、血圧低下、悪心、頻脈、多汗、頭痛等）を起こすおそれがある。
機序・危険因子	本剤はエタノールを含有しているため。

2. 副作用：本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

その他の副作用：大量投与（頻度不明）

悪心・嘔吐、下痢、めまい、頭痛、瞳孔散大、心悸亢進、過呼吸、チアノーゼ、意識喪失、窒息性痙攣等

3. 高齢者への投与：

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

4. 小児等への投与：

小児等への投与を避けること [小児等では副作用が発現しやすい]



鎮咳去たん剤

劇薬 日本薬局方 キョウニン水

キョウニン水「ヤマゼン」

Apricot Kernel Water "Yamazen"

500mL

発売元 東海製薬株式会社

名古屋市中央区江松一丁目105

製造販売元 山善製薬株式会社

大阪市中央区道修町2丁目2番4号

2015年3月改訂

日本標準商品分類番号 872241

〈貯法等〉

気密容器 遮光、室温保存
「取扱い上の注意」の項参照

承認番号 16100AMZ01627000
薬価収載 1986年3月
販売開始 1993年10月
再評価結果 1981年8月

【組成・性状】

本品は定量するとき、シアン化水素 (HCN:27.03)

0.09～0.11w/v%を含む。

本品は無色～微黄色澄明の液で、ベンズアルデヒド様のおい及び特異な味がある。

pH:3.5～5.0

比重 d_{20}^{20} :0.968～0.978

【効能・効果】

急性気管支炎に伴う咳嗽及び喀痰喀出困難

【用法・用量】

キョウニン水として、通常成人1日3mLを3～4回に分割経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。但し、極量として、1回2mL、1日6mLをこえないものとする。

【取扱い上の注意】

光線及び熱によって変化しやすいので、涼しい暗所で保存のこと。

製造番号

使用期限

第一承認

第一販売



キャップ
中
外装フィルム



ラベル