

# 亜鉛華(10%)単軟膏

## 「コザカイ・M」

Zinc Oxide (10%) Simple Ointment 「KOZAKAI・M」

500g

創傷保護収れん剤

販売 岩城製薬株式会社  
東京都中央区日本橋本町4-8-2

※製造販売 小堺製薬株式会社  
東京都墨田区両国4-36-9

使用期限

製造番号

pg

※2012年4月  
製造販売業者の住所変更に伴う改訂等(第2版)  
2010年11月作成(第1版)

<貯法>

容器 気密容器

<販売名>

亜鉛華10%単軟膏「コザカイ・M」

日本標準商品分類番号 872621

承認番号 16000AMZ04068000

薬価収載 1985年 8月

販売開始 2010年11月

再評価結果 1979年 2月

【禁忌】(次の部位には使用しないこと。)

重度又は広範囲の熱傷

[酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。]

【組成・性状】

本品1,000g中に、日本薬局方 酸化亜鉛100gを含有する。  
添加物として、ダイズ油、サラシミツロウ、ジブチルヒドロキシトルエンを含有する。  
本品は白色～淡黄色で、わずかに特異なおいがある。

【効能・効果】

下記皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐  
外傷、熱傷、凍傷、湿疹・皮膚炎、肛門瘻痒症、白癬、面皰、疔、よう  
その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面

【用法・用量】

通常、症状に応じ1日1～数回、患部に塗擦又は貼布する。

【使用上の注意】

1.副作用

本剤は、使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻度不明
過敏症 <sup>注)</sup>	過敏症状
皮膚 <sup>注)</sup>	発疹、刺激感等

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2.適用上の注意

眼には使用しないこと。

〈調剤包装単位コード〉



(01)04987020014575

GS1



(01)14987020014091



キャップ:PP  
容器:PP  
外装フィルム:PVC