

2012年12月作成(第1版)

貯 法 保存条件 火気を避け、室温保存

容 器 気密容器

使用期限 ラベルに記載

外皮用殺菌消毒剤

消毒用マルオアルコール

飲用不可

日本標準商品分類番号 872619

承認番号 22400AMX01129000

薬価収載 2012年12月

販売開始 2012年12月

【禁 忌 (次の部位には使用しないこと)】

損傷皮膚及び粘膜 [刺激作用がある。]

【組成・性状】

1. 組 成

100g中 日本薬局方 エタノール 60.0g

日本薬局方 イソプロパノール 18.0g

添加物 青色1号

2. 製剤の性状

本品は淡青色透明の液で、特異なおいがある。

本品は水又はエタノール(99.5)と混和する。

本品は揮発性である。 比重 d₂₀:0.856~0.862

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】

そのまま塗擦、清浄用として用いる。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

(1) 眼に入らないように注意すること。眼に入った場合には、直ちによく水洗すること。

(2) 広範囲又は長期間使用する場合、蒸気の吸入に注意すること。[イソプロパノール及びエタノール蒸気に大量に又は繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛などを起こすことがある。]

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種 類\頻度	頻度不明
過敏症 ^{注1)}	発疹など
皮 膚 ^{注1)}	刺激症状

注1) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3. 臨床検査結果に及ぼす影響

注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの判断を妨害することがある。



JAN



4 987020 009694

GS1-RSS



(01)14987020009691



発売元

岩城製薬株式会社

東京都中央区日本橋本町4-8-2



製造販売元

日医工株式会社

富山市総曲輪1丁目6番21

使用期限

製造番号

4. 適用上の注意

(1) 投与経路：外用にのみ使用すること。

(2) 使用時

1) 同一部位(皮膚面)に反復使用した場合には、脱脂などによる皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。

2) 本剤は血清、膿汁などのたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具などに用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。

3) 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテルなどには、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。

4) 金属器具を長時間浸漬する必要がある場合には、腐食を防止するために0.2~1%の亜硝酸ナトリウムを添加すること。

5) 引火性、爆発性があるため、火気(電気メス使用なども含む)には十分注意すること。

【取扱い上の注意】

安定性試験⁽¹⁾：

最終包装製品を用いた加速試験(40℃、相対湿度75%、6ヵ月)の結果、通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。

【包 装】500mL, 16L

【主要文献】

(1)日医工株式会社 社内資料:安定性試験

【文献請求先】

主要文献欄に記載の文献・社内資料は下記にご請求下さい。

岩城製薬株式会社

〒103-8434 東京都中央区日本橋小網町19-8

TEL: 03-3668-1573

アルコール類危険等級Ⅱ水溶性
火 気 厳 禁



ボトル：PE
キャップ：PP