

貯法：室温保存

有効期間：3年

承認番号 22600AMX01258000

販売開始 2014年12月

広範囲抗菌点眼剤

処方箋医薬品^{注)}

日本薬局方 レボフロキサシン点眼液

レボフロキサシン点眼液1.5% 「日医工」

Levofloxacin Ophthalmic Solution

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

2.1 本剤の成分、オフロキサシン及びキノロン系抗菌剤に対し過敏症の既往歴のある患者

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	レボフロキサシン点眼液1.5%「日医工」
有効成分	1mL中 レボフロキサシン水和物 15mg
添加剤	等張化剤、pH調節剤

3.2 製剤の性状

販売名	レボフロキサシン点眼液1.5%「日医工」
剤形・性状	無菌水性点眼剤 微黄色～黄色澄明の液
pH	6.1～6.9
浸透圧比	1.0～1.1 (生理食塩液に対する比)

4. 効能又は効果

〈適応菌種〉

本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、ミクロコッカス属、モラクセラ属、コリネバクテリウム属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、インフルエンザ菌、ヘモフィルス・エジプチウス（コッホ・ウィークス菌）、シュードモナス属、緑膿菌、ステノトロホモナス（ザントモナス）・マルトフィリア、アシネトバクター属、アクネ菌

〈適応症〉

眼瞼炎、涙嚢炎、麦粒腫、結膜炎、瞼板腺炎、角膜炎（角膜潰瘍を含む）、眼科手術期の無菌化療

5. 効能又は効果に関連する注意

本剤におけるメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）に対する有効性は証明されていないので、MRSAによる感染症が明らかであり、臨床症状の改善が認められない場合、速やかに抗MRSA作用の強い薬剤を投与すること。

6. 用法及び用量

通常、1回1滴、1日3回点眼する。なお、症状により適宜増減する。

8. 重要な基本的注意

8.1 本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

9.7 小児等

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は8歳未満の小児に投与した臨床試験は実施していない。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異

常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 ショック、アナフィラキシー（いずれも頻度不明）

紅斑、発疹、呼吸困難、血圧低下、眼瞼浮腫等の症状が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	1～5%未満	1%未満	頻度不明
眼	眼刺激	眼のそう痒感	びまん性表層角膜炎等の角膜障害、結膜炎、眼痛、角膜沈着物、眼瞼炎
皮膚		蕁麻疹	発疹、そう痒
その他		味覚異常（苦味等）	

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

患者に対し以下の点に注意するよう指導すること。

- ・薬液汚染防止のため、点眼のとき、容器の先端が直接目に触れないように注意すること。
- ・患眼を開瞼して結膜嚢内に点眼し、1～5分間閉瞼して涙嚢部を圧迫させた後、開瞼すること。
- ・他の点眼剤を併用する場合には、少なくとも5分以上間隔を空けてから点眼すること。
- ・遮光して保存すること。

16. 薬物動態

16.3 分布

16.3.1 生物学的同等性試験

ウサギにおける眼組織内移行を検討し、統計解析を行った結果、レボフロキサシン点眼液1.5%「日医工」とクラビット点眼液1.5%との生物学的同等性が確認された¹⁾。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

主な作用機序はDNAジャイレース（トポイソメラーゼII）活性及びトポイソメラーゼIV活性の阻害による細菌のDNA合成阻害である。DNAジャイレース（トポイソメラーゼII）活性とトポイソメラーゼIV活性のどちらを強く阻害するかは細菌によって異なる^{2) 7)}。

18.2 生物学的同等性試験

実験的緑膿菌角膜感染症に対する治療効果

緑膿菌を接種したウサギに対し、レボフロキサシン点眼液1.5%「日医工」及びクラビット点眼液1.5%それぞれ50μL（レボフロキサシン水和物として0.75mg）を菌接種日は2回、翌日から2日間は3回/日点眼投与を行い、菌接種日から7日目までの角膜混濁のスコア評価並びに7日目の角膜より緑膿菌の分離培養を行った。その結果、レボフロキサシン点眼液1.5%「日医工」及びクラビット点眼液1.5%は、いずれも角膜混濁の増加を著明に抑制し、その治療効果に有意差が認められなかったことから、両剤の生物学的同等性が確認された¹⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：レボフロキサシン水和物（Levofloxacin Hydrate）

略号：LVFX

化学名：(3S)-9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]benzoxazine-6-carboxylic acid hemihydrate

分子式：C₁₈H₂₀FN₃O₄・1/2H₂O

分子量：370.38


性状：淡黄白色～黄白色の結晶又は結晶性の粉末である。

酢酸（100）に溶けやすく、水又はメタノールにやや溶けにくく、エタノール（99.5）に溶けにくい。

0.1mol/L塩酸試液に溶ける。

光によって徐々に暗淡黄白色になる。

化学構造式：



融 点：約226℃（分解）

20. 取扱い上の注意

外箱開封後は、遮光して保存すること。

22. 包装

5mL×5本 [プラスチックボトル]

23. 主要文献

- 1) 社内資料：生物学的同等性試験
- 2) Kato J., et al. : Cell. 1990 ; 63 : 393-404
- 3) Hoshino K., et al. : Antimicrob. Agents Chemother. 1994 ; 38 : 2623-2627
- 4) Akasaka T., et al. : Antimicrob. Agents Chemother. 2001 ; 45 : 2263-2268
- 5) Tanaka M., et al. : Antimicrob. Agents Chemother. 1997 ; 41 : 2362-2366
- 6) Onodera Y., et al. : J. Antimicrob. Chemother. 1999 ; 44 : 533-536
- 7) Onodera Y., et al. : Antimicrob. Agents Chemother. 2002 ; 46 : 1800-1804

24. 文献請求先及び問い合わせ先

日医工株式会社 お客様サポートセンター
〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21
TEL (0120) 517-215
FAX (076) 442-8948

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

