

2012年4月作成(第一版)

劇薬、指定医薬品
貯法：気密容器に保存

日本標準商品分類番号：87719
承認番号：16100AMZ02325000
薬価収載：1986年3月
販売開始：1986年3月

調剤用薬

日本薬局方 ヨウ素 ヨウ素「司生堂」

【禁忌】(次の患者には使用しないこと)

本剤又はヨウ素に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

本品1g中に日本薬局方ヨウ素1gを含有する。

本品は灰白色の板状の又は粒状の重い結晶で、金属性の光沢があり、特異なおいがある。

【効能・効果】【用法・用量】

ヨードチンキ、希ヨードチンキ、複方ヨード・グリセリン等の調剤に用いる。

【使用上の注意】

副作用

1. 副作用等発現状況の概要

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

2. 重大な副作用

アナフィラキシー様症状

アナフィラキシー様症状(呼吸困難、喉頭浮腫、喘鳴、蕁麻疹、潮紅等)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には使用を中止し、適切な処置を行うこと。

【取扱い上の注意】

皮膚や他のものに付着させたり、こぼしたりしないよう十分に注意すること。

配合変化：アルカロイド、アルカリ、炭酸アルカリ、アンモニア、鉄、植物油、抱水クロラール、フェノール、チオ硫酸ナトリウム、タンニンなどと配合変化する。でんぷん含有物は青変する。

【包装】 500g 25g

【参考文献】

日本薬局方解説書(広川書店)

製造販売元

司生堂製薬株式会社
東京都新宿区下落合2丁目12番10号