


貯 法：室温保存
有効期間：3年**テプレノンカプセル50mg「YD」**
TEPRENONE CAPSULES承認番号 22900AMX00567
販売開始 1998年8月

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	テプレノンカプセル50mg「YD」
有効成分	1カプセル中、テプレノン50mg
添加剤	無水ケイ酸、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、トコフェロール、ゼラチン、酸化チタン、ラウリル硫酸Na、黄色5号、青色1号

3.2 製剤の性状

販売名	テプレノンカプセル50mg「YD」
性状・剤形	キャップが灰青緑色不透明、ボディが淡橙色不透明の硬カプセル剤で、内容物は白色～帯黄白色の粉末
外形	
大きさ	4号カプセル
識別コード	YD480

4. 効能又は効果

- 下記疾患の胃粘膜病変（びらん、出血、発赤、浮腫）の改善
急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期
- 胃潰瘍

6. 用法及び用量

通常成人、3カプセル（テプレノンとして150mg）を1日3回に分けて食後に経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。妊娠中の投与を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

一般に、生理機能が低下していることが多い。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 肝機能障害、黄疸（いずれも頻度不明）

AST、ALT、 γ -GTP、Al-Pの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。

11.2 その他の副作用

	0.1～5%未満	0.1%未満	頻度不明
消化器		便秘、下痢、嘔気、口渇、腹痛、腹部膨満感	
肝臓	AST、ALTの上昇		

	0.1～5%未満	0.1%未満	頻度不明
精神神経系		頭痛	
過敏症		発疹、痒痒感	
その他		総コレステロールの上昇、眼瞼の発赤・熱感	血小板減少

注）発現頻度は製造販売後調査を含む。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

16. 薬物動態


16.1 血中濃度

16.1.1 生物学的同等性試験

テプレノンカプセル50mg「YD」とセルベックスカプセル50mgをクロスオーバー法によりそれぞれ2カプセル（テプレノンとして100mg）、健康成人男子15名に食後単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定した。得られた薬物動態パラメータ（AUC、Cmax）について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された¹⁾。

	判定パラメータ		参考パラメータ
	AUC ₀₋₁₂ ($\mu\text{g}\cdot\text{hr}/\text{mL}$)	Cmax ($\mu\text{g}/\text{mL}$)	Tmax (hr)
テプレノンカプセル50mg「YD」	4.57±2.32	2.15±1.45	4.9±0.3
セルベックスカプセル50mg	4.72±2.14	2.28±1.47	4.8±0.6

(平均値±標準偏差、n=15)




血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

16.2 吸収

16.2.1 食事の影響

健康成人男子（18名）にテプレノン3カプセル（テプレノンとして150mg^{注1)}）をクロスオーバー法で食後30分、1時間及び3時間に経口投与し、血漿中濃度を測定し、下図及び下表に示した。血漿中濃度曲線下面積（AUC）は食後30分投与を100%とすると、食後1

時間投与では変化なく、食後3時間投与では約23%低下した²⁾。



テプレノン150mg^{注)}単回投与後の血漿中テプレノン濃度

テプレノンの薬物動態パラメータ

	AUC ₀₋₂₄ (µg·hr/mL)	Cmax (µg/mL)	Tmax (hr)
食後30分	4.768±1.368	2.087±1.041	5.4±0.5
食後1時間	4.858±1.434	2.274±0.930	5.1±0.6
食後3時間	3.671±1.296	1.562±0.852	4.3±0.9

(平均値±標準偏差, n=18)

注) 150mg単回経口投与は承認外用量である。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

テプレノンは細胞レベルで糖蛋白質代謝を改善し、粘膜の防御機構として胃粘液(糖蛋白質)合成・分泌を正常化し、粘膜の血流を改善することにより、攻撃因子から胃粘膜を防御しているものと考えられている。

18.2 抗潰瘍作用

ラットを用いた各種実験潰瘍(寒冷拘束ストレス、インドメタシン、アスピリン、プレドニゾロン、レセルピン、酢酸、焼灼、アスピリン-寒冷拘束ストレス)、各種実験胃粘膜病変(塩酸、アスピリン、エタノール、放射線)で、それぞれに強い抗潰瘍作用、胃粘膜病変改善作用が確認されている^{3)~6)}。

更に、ラットを用いた実験で、活性酸素が関与していると考えられるcompound48/80、血小板活性化因子(PAF)による胃粘膜障害を抑制することも確認されている^{7),8)}。

18.3 胃粘液増加作用

- ラット由来の培養胃粘膜上皮細胞において粘液の合成・分泌を促進する⁹⁾。
 - ラットにおいて粘液を分泌する表層粘液細胞、頸細胞に分布し、これら由来の粘液量を増加させる^{10),11)}。
 - ラットにおいて胃粘膜の再生・防御の主要因子である高分子糖蛋白、モルモットにおいてリン脂質の生合成酵素活性を高め、ラット及びヒトにおいてこれらの合成・分泌を促進する^{12)~15)}。
- 更に胃粘液中へ重碳酸塩の分泌を高めることもラット、ウサギで確認されている¹⁶⁾。

18.4 熱ショック蛋白(HSP)誘導による細胞保護作用

モルモットにおいて、胃粘膜細胞内のHSP60、70、90を誘導し、細胞保護作用を示すことが確認されている¹⁷⁾。

18.5 胃粘膜プロスタグランジン増加作用

ラットにおいて胃粘膜プロスタグランジンE₂、I₂含量を増加させる。その機序としてはプロスタグランジン生合

成酵素活性を高めることがラットで確認されている¹⁸⁾。

18.6 胃粘膜血流増加並びに改善作用

ラットにおいて胃粘膜血流を増加させ、水浸拘束ストレスによる胃粘膜血流の低下を改善する¹⁹⁾。

18.7 胃粘膜保護作用

ラットにおいてエタノールによる胃粘膜障害を抑制する²⁰⁾。

健康成人男子においてエタノール負荷による胃粘膜障害を抑制する²¹⁾。

18.8 胃粘膜増殖帯細胞の恒常性維持作用

マウスにおいてヒドロコチゾンによる胃粘膜増殖帯細胞の増殖能の低下を改善し、胃粘膜細胞増殖帯の恒常性を保つ²²⁾。

ラット酢酸潰瘍において胃粘膜新生能を賦活して欠損胃粘膜の修復を促進する²³⁾。

18.9 脂質過酸化抑制作用

ラットにおいて熱傷ストレス負荷による胃粘膜障害を抑制すると同時に胃粘膜中の過酸化脂質の増加を抑制する²⁴⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：テプレノン (Teprenone)

化学名：(5*E*,9*E*,13*E*)-6,10,14,18-

Tetramethylnonadeca-5,9,13,17-tetraen-2-one

(5*Z*,9*E*,13*E*)-6,10,14,18-

Tetramethylnonadeca-5,9,13,17-tetraen-2-one

分子式：C₂₃H₃₈O

分子量：330.55


性状：無色～微黄色澄明の油状の液で、僅かに特異なおいがある。

エタノール(99.5)、酢酸エチル又はヘキササンと混和する。

水にほとんど溶けない。

空気によって酸化され、徐々に黄色となる。

化学構造式：



20. 取扱い上の注意

アルミ袋開封後は光及び湿気を避けて保存すること。

22. 包装

100カプセル [10カプセル (PTP) ×10]

23. 主要文献

- (株)陽進堂社内資料：生物学的同等性試験
- 長谷川二郎 他：消化器科. 1987; 7(6): 740-752
- Murakami, M. et al.: *Arzneim. Forsch.* 1981; 31-1(5): 799-804
- Murakami, M. et al.: *Jpn. J. Pharmacol.* 1982; 32(5): 921-924
- 村上学 他：消化器科. 1987; 7(6): 613-616
- 渡辺敦光 他：消化器科. 1987; 7(6): 623-630
- 小林隆 他：*Ulcer Research.* 1994; 21(1): 66-69
- 佐藤泰男 他：*Prog. Med.* 1992; 12(3): 583-586
- Terano, A. et al.: *Digestion.* 1986; 33(4): 206-210
- 中村正彦 他：*Prog. Med.* 1990; 10(3): 561-568
- 滝内比呂也 他：*臨牀と研究.* 1993; 70(11): 3666-3670

- 12) 内田秀一 他：医学のあゆみ. 1987；143(7)：605-606
- 13) 西崎朗 他：日本消化器病学会雑誌. 1990；87(10)：2352-2357
- 14) Oketani, K. et al.：Jpn. J. Pharmacol. 1983；33(3)：593-601
- 15) 青野充 他：日本消化器病学会雑誌. 1984；81(S.)：2389
- 16) Pappas, T. N. et al.：Gastroenterology. 1986；90(5)：1578
- 17) Hirakawa, T. et al.：Gastroenterology. 1996；111(2)：345-357
- 18) 松田泰行 他：基礎と臨床. 1989；23(17)：6823-6827
- 19) 中村紀夫 他：臨床と研究. 1984；61(5)：1533-1541
- 20) Terano, A. et al.：Digestion. 1986；35(3)：182-188
- 21) Arakawa, T. et al.：Digestion. 1988；39(2)：111-117
- 22) 村上学 他：日本薬理学雑誌. 1982；79(6)：591-597
- 23) Kohli, Y. et al.：京都府立医科大学雑誌. 1991；100(6)：637-644
- 24) 竹村俊樹 他：臨床薬理. 1989；20(1)：97-98

*** 24. 文献請求先及び問い合わせ先**

ニプロ株式会社 医薬品情報室
〒566-8510 大阪府摂津市千里丘新町3番26号
TEL 0120-226-898
FAX 050-3535-8939

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元



*** 26.2 販売元**

