

選択的ヒスタミンH₁受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

日本薬局方

ベポタスチンベシル酸塩錠

ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「トーフ」

ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーフ」

BEPOTASTINE BESILATE TABLETS 5mg "TOWA"/TABLETS 10mg "TOWA"

貯 法：室温保存
 使用期限：外箱、ラベルに記載

日本標準商品分類番号 87449				
	承認番号	薬価収載	販売開始	効能追加
錠 5 mg	22400AMX01145	2018年6月	2018年6月	2019年11月
錠10mg	22400AMX01146	2018年6月	2018年6月	2019年11月

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

		ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「トーフ」	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーフ」
1錠中の有効成分		日局 ベポタスチンベシル酸塩 ……………5mg	日局 ベポタスチンベシル酸塩 ……………10mg
添加物		D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール6000、酸化チタン、タルク	
性状		白色のフィルムコーティング錠	白色の割線入りのフィルムコーティング錠
本体表示	表	ベポタスチン 5 トーフ	ベポタス 10
	裏		ベポタスチン 10 トーフ
外形	表		
	裏		
	側面		
錠径(mm)		6.0	7.1
厚さ(mm)		2.9	3.2
質量(mg)		93	139

※【効能・効果】

<成人>

アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患に伴うそう痒（湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚そう痒症）

※<小児>

アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症）に伴うそう痒

※【用法・用量】

<成人>

通常、成人にはベポタスチンベシル酸塩として1回10mgを1日2回経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

※<小児>

通常、7歳以上の小児にはベポタスチンベシル酸塩として1回10mgを1日2回経口投与する。

※【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

腎機能障害のある患者〔本剤の血中濃度を上昇させることがある。また、高い血中濃度が持続するおそれがあるので、低用量（例えば1回量5mg）から投与するなど慎重に投与し、異常が認められた場合は減量、休薬するなど適切な処置を行う。〕

2. 重要な基本的注意

- 1) 眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
- 2) 長期ステロイド療法を受けている患者で、本剤投与によりステロイドの減量を図る場合には十分な管理下で徐々に行うこと。
- 3) 本剤を季節性の患者に投与する場合は、好発季節を考慮して、その直前から投与を開始し、好発季節終了時まで続けることが望ましい。
- 4) 本剤の使用により効果が認められない場合には、漫然と長期にわたり投与しないように注意すること。

3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

副作用が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

	頻度不明
血液	白血球数増加、白血球数減少、好酸球増多
精神神経系	眠気、けん怠感、頭痛、頭重感、めまい
消化器	口渇、悪心、胃痛、胃部不快感、下痢、口内乾燥、舌炎、嘔吐、腹痛、便秘
過敏症	発疹、腫脹、蕁麻疹
肝臓	AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、γ-GTP上昇、LDH上昇、総ビリルビン上昇
腎臓	尿潜血、尿蛋白、尿糖、尿ウロビリノーゲン、尿量減少、排尿困難、尿閉
その他	月経異常、浮腫、動悸、呼吸困難、しびれ、味覚異常

4. 高齢者への投与

本剤は、主として腎臓から排泄されるが、一般に高齢者では生理機能が低下していることが多いため高い血中濃度が持続するおそれがあるので注意すること。

5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- 1) 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、投与しないことが望ましいが、やむを得ず投与する場合には、治療上の有益性が危険性を上まわると判断される場合にのみ投与すること。〔妊娠中の投与に関する安全性は確立しておらず、また、動物実験で胎児への移行が認められている。〕

2) 授乳中の女性には投与しないことが望ましいが、やむを得ず本剤を投与する場合には授乳を避けさせること。〔動物実験(ラット)で乳汁中への移行が報告されている。〕

※ 6. 小児等への投与¹⁾

低出生体重児、新生児、乳児又は幼児に対する安全性は確立していない。(使用経験が少ない)

7. 適用上の注意


薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。〔PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。〕

【薬物動態】

1. 生物学的同等性試験

1) ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」

ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠(ベポタスチンベシル酸塩として10mg)健康成人男子(n=12)に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log(0.80)~log(1.25)の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された²⁾。



	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₁₀ (ng·hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T _{1/2} (hr)
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」 (錠剤, 10mg)	379.2±47.6	105.742±19.675	1.250±0.337	2.294±0.214
標準製剤 (錠剤, 10mg)	360.4±47.3	90.508±15.324	1.417±0.359	2.287±0.246

(Mean±S.D., n=12)

血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

2) ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「トーワ」

ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「トーワ」は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン(平成18年11月24日 薬食審査発第1124004号)」に基づき、ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」を標準製剤としたとき、溶出挙動が等しく、生物学的に同等とみなされた³⁾。

2. 溶出挙動


ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「トーワ」及びベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」は、日本薬局方医薬品各条に定められたベポタスチンベシル酸塩錠の溶出規格にそれぞれ適合していることが確認されている⁴⁾⁵⁾。

【薬効薬理】

ヒスタミンH₁受容体拮抗作用を主体とし、ケミカルメディエーター(ロイコトリエン、トロンボキサン、PAF等)の産生・遊離抑制作用を現す。好酸球浸潤・増多抑制やインターロイキン-5の産生抑制も示唆されている⁶⁾。

【有効成分に関する理化学的知見】

構造式：



一般名：ベポタスチンベシル酸塩 (Bepotastine Besilate)

化学名：(S)-4-{4-[(4-Chlorophenyl)(pyridin-2-yl)methoxy]piperidin-1-yl}butanoic acid monobenzenesulfonate

分子式：C₂₁H₂₅ClN₂O₃・C₆H₅O₃S

分子量：547.06

性状：白色～微黄白色の結晶又は結晶性の粉末である。酢酸(100)に極めて溶けやすく、水又はエタノール(99.5)にやや溶けにくい。本品1gを水100mLに溶かした液のpHは約3.8である。

融点：159～163℃

【取扱い上の注意】

安定性試験

最終包装製品を用いた加速試験(40℃、相対湿度75%、6ヵ月)の結果、通常の市場流通下においてそれぞれ3年間安定であることが推測された⁷⁾⁸⁾。

【包装】

ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「トーワ」：100錠(PTP)

ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」：

100錠、500錠(PTP)

140錠(14錠×10：PTP)

500錠(バラ)

【主要文献】

- 1) 馬場 駿吉：臨床医薬, 18(12), 1371, 2002
- 2) 東和薬品株式会社 社内資料：生物学的同等性試験(錠10mg)
- 3) 東和薬品株式会社 社内資料：生物学的同等性試験(錠5mg)
- 4) 東和薬品株式会社 社内資料：溶出試験(錠5mg)
- 5) 東和薬品株式会社 社内資料：溶出試験(錠10mg)
- 6) 第十七改正日本薬局方解説書, C-5025, 2016
- 7) 東和薬品株式会社 社内資料：安定性試験(錠5mg)
- 8) 東和薬品株式会社 社内資料：安定性試験(錠10mg)

※※【文献請求先・製品情報お問い合わせ先】

東和薬品株式会社 学術部DIセンター

〒570-0081 大阪府守口市日吉町2丁目5番15号

TEL 0120-108-932 FAX 06-7177-7379

https://med.towayakuhin.co.jp/medical/

製造販売元

東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号