

日本標準商品分類番号
87449

貯法：室温保存
有効期間：3年

	シロップ0.02%	ドライシロップ0.1%
承認番号	21900AMX01482	21900AMX01309
販売開始	1998年7月	1994年7月

アレルギー性疾患治療剤

ケトチフェンフル酸塩シロップ・ドライシロップ

ケトチフェンシロップ0.02%「NIG」

ケトチフェンドライシロップ0.1%「NIG」

Ketotifen Syrup · Dry Syrup

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

- 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2.2 てんかん又はその既往歴のある患者 [9.1.1 参照]

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	ケトチフェンシロップ 0.02%「NIG」	ケトチフェンドライシロップ 0.1%「NIG」
有効成分	1mL中： ケトチフェンフル酸塩 0.276mg (ケトチフェンとして0.2mg)	1g中： ケトチフェンフル酸塩 1.38mg (ケトチフェンとして1mg)
添加剤	精製白糖、D-ソルビトール液、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル、リン酸水素ナトリウム水和物、pH調節剤、香料	デキストリン、乳糖水和物、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、プロピレン glycol、香料

3.2 製剤の性状

販売名	ケトチフェンシロップ 0.02%「NIG」	ケトチフェンドライシロップ 0.1%「NIG」
色・性状	無色～微黄色透明の液	白色の細粒
pH	4.5～5.5	—

4. 効能又は効果

- 気管支喘息
○アレルギー性鼻炎
○蕁麻疹・湿疹・皮膚炎・皮膚瘙痒症

6. 用法及び用量

〈ケトチフェンシロップ0.02%「NIG」〉

通常、小児には1日量0.3mL/kg（ケトチフェンとして0.06mg/kg）を2回、朝食後及び就寝前に分けて経口投与する。

なお、年齢・症状により適宜増減する。

年齢別の標準投与量は、通常、下記の用量を1日量とし、1日2回、朝食後及び就寝前に分けて経口投与する。

〈ケトチフェンドライシロップ0.1%「NIG」〉

通常、小児には1日量0.06g/kg（ケトチフェンとして0.06mg/kg）を2回、朝食後及び就寝前に分け、用時溶解して経口投与する。

なお、年齢・症状により適宜増減する。

年齢別の標準投与量は、通常、下記の用量を1日量とし、1日2回、朝食後及び就寝前に分け、経口投与する。

年 齡	1日用量		
	ケトチフェンシロップ 0.02%「NIG」として	ケトチフェンドライ シロップ0.1%「NIG」として	ケトチフェン として
6ヶ月以上 3歳未満	4mL	0.8g	0.8mg
3歳以上 7歳未満	6mL	1.2g	1.2mg
7歳以上	10mL	2.0g	2.0mg

ただし、1歳未満の乳児に使用する場合には体重、症状などを考慮して適宜投与量を決める。

8. 重要な基本的注意

〈効能共通〉

8.1 眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること。

〈気管支喘息〉

8.2 本剤はすでに起こっている発作を速やかに軽減する薬剤ではないので、このことを患者に十分に説明しておく必要がある。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 てんかんを除く痙攣性疾患、又はこれらの既往歴のある患者 痉攣閾値を低下させることがある。[2.2 参照]

9.1.2 長期ステロイド療法を受けている患者

本剤投与によりステロイドの減量をはかる場合は十分な管理下で徐々に行うこと。

9.3 肝機能障害患者

肝機能障害患者を対象とした臨床試験は実施していない。

9.5 妊婦

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

9.7 小児等

乳児、幼児に投与する場合には、観察を十分に行い慎重に投与すること。痙攣、興奮等の中枢神経症状があらわれることがある。[11.1 参照]

10. 相互作用

10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
中枢神経抑制剤 (鎮静剤、催眠剤等)	眠気、精神運動機能低下等を起こすことがある。	いずれも中枢神経抑制作用を有するため。
抗ヒスタミン剤 アルコール	アルコール性飲料の摂取を制限すること。	

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなどの適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 痙攣、興奮（頻度不明）

乳児、幼児では特に注意すること。[9.7 参照]

11.1.2 肝機能障害、黄疸（頻度不明）

AST、ALT、ALP、LDH、γ-GTPの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。

11.2 その他の副作用

	0.1%～5%未満	0.1%未満	頻度不明
泌尿器	—	—	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感等の膀胱炎様症状
過敏症	—	発疹、蕁麻疹	浮腫、多形紅斑
精神神経系	眠気	めまい、ふらつき、けん怠感、口渴	一過性の意識消失、頭痛、味覚異常、しひれ感、易刺激性、不眠、神経過敏、鎮静
消化器	—	恶心、下痢、嘔吐、便秘	腹痛、胃部不快感、食欲不振、口内炎
肝臓	—	AST、ALT、ALPの上昇	LDH、γ-GTPの上昇
その他	—	体重増加	ほてり、鼻出血、動悸、月経異常

12. 臨床検査結果に及ぼす影響

本剤は、アレルゲン皮内反応を抑制するため、アレルゲン皮内反応検査を実施する3~5日前より本剤の投与を中止することが望ましい¹⁾。

13. 過量投与

13.1 徴候、症状

傾眠、見当識障害、チアノーゼ、呼吸困難、発熱、錯乱、痙攣、頻脈、徐脈、低血圧、眼振、可逆性昏睡等。特に小児では、興奮性亢進、痙攣²⁾。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意

〈シロップ〉

14.1.1 他剤との配合は、できるだけ避けることが望ましい。


16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 生物学的同等性試験

〈ケトチフェンシロップ0.02%「NIG」〉

(1) ケトチフェンシロップ0.02%「NIG」とザジテンシロップ0.02%を、クロスオーバー法によりそれぞれ10mL〔ケトチフェンマル酸塩として2.76mg（ケトチフェンとして2mg）〕健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中ケトチフェンマル酸塩濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、Cmax）について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された³⁾。



薬物動態パラメータ


	投与量 (mg)	AUC ₀₋₂₄ (ng · hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T _{1/2} (hr)
ケトチフェンシロップ 0.02%「NIG」	2	97.5±20.8	8.9±2.0	2.9±0.7	9.4±2.6
ザジテンシロップ 0.02%	2	95.7±16.8	8.7±1.6	2.9±0.9	8.7±1.3

(平均±標準偏差、n=14)

血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

〈ケトチフェンドライシロップ0.1%「NIG」〉

(2) ケトチフェンドライシロップ0.1%「NIG」とザジテンドライシロップ0.1%を、クロスオーバー法によりそれぞれ2g〔ケトチフェンマル酸塩として2.76mg（ケトチフェンとして2mg）〕健康成人男子に単回経口投与して血漿中ケトチフェン濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、Cmax）について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された³⁾。



薬物動態パラメータ

	投与量 [*] (mg)	AUC ₀₋₂₄ (ng · hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T _{1/2} (hr)
ケトチフェンドライ シロップ0.1%「NIG」	2	142.8±28.0	15.0±3.0	2.9±1.4	5.8±2.2
ザジテンドライ シロップ0.1%	2	133.9±19.2	15.2±2.3	2.9±1.4	6.1±2.0

*ケトチフェンとしての投与量 (平均±標準偏差、n=14)
血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

ケトチフェンはケミカルメディエーター遊離抑制に基づく抗アナフィラキシー作用及び抗ヒスタミン作用を有し、かつ、気道及び鼻粘膜等の組織の過敏性を減弱させる。更に、PAF（血小板活性化因子）による気道の反応性亢進を抑制し、好酸球に対する作用を有する⁴⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：ケトチフェンフル酸塩（Ketotifen Fumarate）

化学名：4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10(9H)-one monofumarate


分子式：C₁₉H₁₉NOS · C₄H₄O₄

分子量：425.50

融点：約190°C (分解)

性状：白色～淡黄白色の結晶性の粉末である。メタノール又は酢酸(100)にやや溶けにくく、水、エタノール(99.5)又は無水酢酸に溶けにくい。

化学構造式：



20. 取扱い上の注意

〈ドライシロップ〉

開封後は湿気を避けて保存すること。

22. 包装

〈ケトチフェンシロップ0.02%「NIG」〉

500mL (プラスチックボトル)

〈ケトチフェンドライシロップ0.1%「NIG」〉

100g (プラスチックボトル、バラ、乾燥剤入り)

23. 主要文献

1) Debelic, M. et al. : Dtsch. med. Wschr., 1981, 106 (50), 1704-1707

2) Le Blaye, I. et al. : Drug Safety, 1992, 7 (5), 387-392

3) 社内資料：生物学的同等性試験

4) 第十八改正日本薬局方 医薬品情報 JPD12021.じほう : 2021 : 255-256

24. 文献請求先及び問い合わせ先

日医工株式会社 お客様サポートセンター

〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21

TEL (0120) 517-215

FAX (076) 442-8948

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

日医工岐阜工場株式会社
NICHIKO 富山市総曲輪1丁目6番21

26.2 発売元

日医工株式会社
NICHIKO 富山市総曲輪1丁目6番21

26.3 販売

武田薬品工業株式会社
大阪市中央区道修町四丁目1番1号