

※※印：2022年12月改訂(第15版、承継に伴う改訂)  
※印：2020年 7月改訂

日本標準商品分類番号

87219

貯法：しゃ光・室温保存  
使用期限：シリンジ及び外装に表示の使用期限内に使用すること。  
規制区分：処方箋医薬品  
(注意－医師等の処方箋により使用すること)

	20mg	40mg	80mg
※ 承認番号	30200AMX00682000	30200AMX00683000	30200AMX00684000
※※ 薬価収載	2022年12月	2022年12月	2022年12月
販売開始	2003年 6月	2003年 6月	2003年 6月

日本薬局方

# オザグレルナトリウム注射液

トロンボキサン合成酵素阻害剤

※、※※ **オザグレル** Na点滴静注20mgシリンジ「NIG」

※、※※ **オザグレル** Na点滴静注40mgシリンジ「NIG」

※、※※ **オザグレル** Na点滴静注80mgシリンジ「NIG」

**Ozagrel Na I.V. Infusion Syringe**

## 【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

- (1) 出血している患者：出血性脳梗塞、硬膜外出血、脳内出血又は原発性脳室内出血を合併している患者〔出血を助長する可能性がある〕
- (2) 重篤な意識障害を伴う大便秘の患者、脳塞栓症の患者〔出血性脳梗塞が発現しやすい〕
- (3) 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

## 【原則禁忌(次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること)】

脳塞栓症のおそれのある患者：心房細動、心筋梗塞、心臓弁膜疾患、感染性心内膜炎及び瞬時完成型の神経症状を呈する患者〔脳塞栓症の患者は出血性脳梗塞が発現しやすい〕

## 【組成・性状】

		オザグレルNa点滴 静注20mgシリンジ 「NIG」	オザグレルNa点滴 静注40mgシリンジ 「NIG」	オザグレルNa点滴 静注80mgシリンジ 「NIG」
組 成	1シリンジ (0.5mL)中	1シリンジ (1mL)中	1シリンジ (2mL)中	
	有効成分	オザグレルナトリウム		
	添加物	20mg	40mg	80mg
性状	pH調節剤 無色澄明の注射液			
pH	7.7～8.7*			
浸透圧比	0.2～0.3* (日局生理食塩液に対する比)			

\*本品1mLに水3mLを加えた液

## 【効能・効果】

1. クモ膜下出血術後の脳血管攣縮およびこれに伴う脳虚血症状の改善
2. 脳血栓症(急性期)に伴う運動障害の改善

## 【用法・用量】

1. クモ膜下出血術後の脳血管攣縮およびこれに伴う脳虚血症状の改善  
通常成人に、オザグレルナトリウムとして1日量80mgを適量の電解質液または糖液で希釈し、24時間かけて静脈内に持続投与する。投与はクモ膜下出血術後早期に開始し、2週間持続投与することが望ましい。なお、年齢、症状により適宜増減する。
2. 脳血栓症(急性期)に伴う運動障害の改善  
通常成人に、オザグレルナトリウムとして1回量80mgを適量の電解質液または糖液で希釈し、2時間かけて1日朝夕2回の持続静注を約2週間行う。なお、年齢、症状により適宜増減する。

## 【使用上の注意】

### 1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

- (1) 出血している患者：消化管出血、皮下出血等〔出血を助長する可能性がある〕
- (2) 出血の可能性のある患者：脳出血の既往歴のある患者、重症高血圧患者、重症糖尿病患者、血小板の減少している患者等〔出血を助長する可能性がある〕
- (3) 抗血小板剤、血栓溶解剤、抗凝血剤を投与中の患者〔**相互作用**〕の項参照)

### 2. 重要な基本的注意

本剤の投与により**出血性脳梗塞、硬膜外出血、脳内出血**を助長する可能性があるため、救急処置のとれる準備を行い投与すること。また、臨床症状及びコンピュータ断層撮影による観察を十分に行い、出血が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。

### 3. 相互作用

**併用注意**(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
抗血小板剤 チクロピジン アスピリン 等	これらの薬剤と併用することにより出血傾向の増強をきたすおそれがある。	本剤は血小板凝集能を抑制するため、類似の作用を持つ薬剤を併用することにより作用を増強する可能性がある。
血栓溶解剤 ウロキナーゼ アルテプラザ 等	観察を十分に行い、減量するなど用量を調節すること。	
抗凝血剤 ヘパリン ワルファリン アルガトロバン 水和物 等		

### 4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

#### (1) 重大な副作用(頻度不明)

- 1) **出血 出血性脳梗塞・硬膜外血腫・脳内出血、消化管出血、皮下出血、血尿**等があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止すること。〔血小板凝集能を抑制するため〕
- 2) **ショック、アナフィラキシー** ショック、アナフィラキシーを起こすことがあるので、観察を十分に行い、血圧低下、呼吸困難、喉頭浮腫、冷感等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 3) **肝機能障害、黄疸** 著しいAST(GOT)・ALT(GPT)の上昇等を伴う重症な肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような場合には投与を中止し適切な処置を行うこと。
- 4) **血小板減少** 血小板減少があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には減量又は投与を中止すること。

- 5) **白血球減少、顆粒球減少** 白血球減少、顆粒球減少があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。発症時には発熱や悪寒等がみられることが多いので、これらの症状があらわれた時は本症を疑い血液検査を行うこと。
- 6) **腎機能障害** 重篤な腎機能障害(急性腎障害等)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し適切な処置を行うこと。なお、腎機能障害時には血小板減少を伴うことが多い。

(2) **その他の副作用**

	頻度不明
過敏症 <sup>注1)</sup>	発疹、蕁麻疹、紅斑、喘息(様)発作、そう痒等
循環器 <sup>注2)</sup>	上室性期外収縮、血圧下降
血液	貧血
肝臓	AST(GOT)・ALT(GPT)、LDH、アルカリフォスファターゼの上昇、ビリルビン上昇等
腎臓	BUN上昇、クレアチニン上昇
消化器	嘔気、嘔吐、下痢、食欲不振、膨満感
その他	発熱、頭痛、胸内苦悶感、注射部の発赤・腫脹・疼痛、ほてり、悪寒・戦慄、関節炎、CRP上昇、CK(CPK)上昇

注1) 発現した場合には投与を中止すること。

注2) 発現した場合には減量又は投与を中止すること。

5. **高齢者への投与**

一般に高齢者では生理機能が低下しているので慎重に投与すること。

6. **妊婦、産婦、授乳婦等への投与**

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上まわると判断される場合にのみ投与すること。〔妊娠中の投与に関する安全性は確立していない〕

7. **小児等への投与**

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない。

8. **適用上の注意**

- (1) 調製時：カルシウムを含む輸液で希釈すると白濁することがあるので、カルシウムを含む輸液(リンゲル液等)を希釈に用いるときは、本剤80mgあたり300mL以上の輸液で使用すること。
- (2) 本剤の使用は1回限りとし、開封後は速やかに使用し、使用後は廃棄すること。

【薬効薬理】<sup>1)</sup>

アラキドン酸カスケード中のトロンボキサン<sub>2</sub>(TXA<sub>2</sub>)合成酵素を選択的に阻害してTXA<sub>2</sub>の産生を抑制し、TXA<sub>2</sub>による血小板凝集能を抑制すると共に、プロスタサイクリンの産生を促進して、両者のバランス異常を改善する。また、脳血管攣縮や脳血流量低下の抑制作用も認められている。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：オザグレリナトリウム(Ozagrel Sodium)


化学名：Monosodium (2E)-3-[4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)phenyl]prop-2-enoate

分子式：C<sub>13</sub>H<sub>11</sub>N<sub>2</sub>NaO<sub>2</sub>

分子量：250.23

性状：白色の結晶又は結晶性の粉末である。水に溶けやすく、メタノールにやや溶けやすく、エタノール(99.5)にほとんど溶けない。

構造式：



【取扱い上の注意】<sup>2)</sup>

安定性試験結果の概要

加速試験(40℃、相対湿度75%、6ヵ月)の結果、オザグレリNa点滴静注20mgシリンジ〔N I G〕、オザグレリNa点滴静注40mgシリンジ〔N I G〕及びオザグレリNa点滴静注80mgシリンジ〔N I G〕は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。

【包装】

- オザグレリNa点滴静注20mgシリンジ〔N I G〕  
(1シリンジ0.5mL中20mg)  
10シリンジ
- オザグレリNa点滴静注40mgシリンジ〔N I G〕  
(1シリンジ1mL中40mg)  
10シリンジ
- オザグレリNa点滴静注80mgシリンジ〔N I G〕  
(1シリンジ2mL中80mg)  
10シリンジ

【主要文献】

- 1) 第十七改正日本薬局方解説書
- 2) 日医工岐阜工場(株)社内資料(安定性試験)


※【文献請求先・製品情報お問い合わせ先】

主要文献欄に記載の文献・社内資料は下記にご請求下さい。

日医工株式会社 お客様サポートセンター  
〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21  
TEL (0120) 517-215  
FAX (076) 442-8948

シリンジの使用方法

- ①ゴム栓を回しながら引き抜いてください。



- ②ゴム栓を外したら直ちに注射針を装着し、ご使用ください。

〈注意〉

- ゴム栓取り外しの際、ルアー部(針装着部)に指が触れないようにしてください。誤って指が触れてしまった場合は使用しないでください。
- ピロー包装開封前に破れ・はがれ等があった場合は使用しないでください。
- ピロー包装から取り出したとき、薬液の漏れ等が無いか確認し、万一、異常が認められた場合には使用しないでください。
- 本剤の使用は1回限りとし、開封後は速やかに使用し、使用後は廃棄してください。

販売

**武田薬品工業株式会社**  
大阪市中央区道修町四丁目1番1号

※※  発売元  
**日医工株式会社**  
富山市総曲輪1丁目6番21

※※  製造販売元  
**日医工岐阜工場株式会社**  
富山市総曲輪1丁目6番21